

21.
ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
M

Ann. 3.
pag. 256

VI 168



Cote qu'une page

J. Dureau

ARC4

no 98

Extrait
de remarques et d'observations sur la rage
insérées dans le 5^e et le 8^e Volume des observations et de recherches
de Médecine par une société de Médecins à Londres.

observations communiquées par M. Thomas Dickson
médecin de l'hôpital de Londres.

Au commencement de janvier 1767, un grand nombre de personnes
furent mordues par des gros chiens que l'on a regardés comme enragés
et qui a été tué avec grande difficulté. Jean Brown âgé de 15 ans,
mordu par cet animal, fut transporté sur le champ à l'hôpital de
Londres. la joue et l'épaule du côté droit avoient été blessés. on les
lavas et on les laissa écouler le sang avec liberté. ensuite on les frotta
avec de l'onguent mercuriel. cette friction fut
répétée deux fois par jour pendant dix jours et il n'y eut ni salivation
ni affection des gencives. Cet enfant n'ayant aucune espèce d'incommode
sortit de l'hôpital au bout de trois semaines, ayant été purgé trois fois.
il continua de jouir d'une bonne santé jusqu'au 30 avril suivant.
quatre mois après l'accident. Dans ce temps il sentit une douleur
à la joue droite, la quelle s'étendit pendant la nuit jusqu'à la gorge.
le lendemain il ne put boire ni manger. la douleur et une espèce de
resserrement à la gorge et les joues furent plus violentes. la respiration
devint très difficile. il fut très agité et porta de temps en temps avec
promptitude les mains à la joue et à la gorge pour éviter d'être
l'impulsion de l'air sur les parties les quelle lui excitent une douleur
excessive. il tenoit pour cette raison son menton appuyé contre la
poitrine. il repoussait avec grande force de sa bouche et une
distance considérable beaucoup de salive humide. il sortoit aussi
des narines une grande quantité de matière muqueuse. Depuis
le temps qu'il étoit sorti de l'hôpital, il ne pouvoit avoir aucune
crainte sur les suites fâcheuses de la morsure du chien. mais
entendant parler d'une personne mordue par le même animal
et qui devoit mourir, il fut assailli dans le moment une douleur
dans l'épaule blessée la quelle s'étendit jusqu'à la joue et la
chien avoit jeté la barrière. On tâcha de calmer son esprit, en
lui assurant que le chien n'étoit point enragé et qu'il ne feroit
point à qu'il étoit comme la première fois. et l'engagea à boire
un verre d'eau, mais il repoussait avec vivacité qu'il ne le prouvât
point.

appendant on lui presenta a boire; et a la vue de l'eau il
parut beaucoup plus agité. ~~Ensuite~~ il voulut remuer ses
de boire. Cependant il port le verre dans sa main et le porta plusieurs
fois vers sa bouche mais sans qu'il le touchât. il rejette
ensuite beaucoup de matiere cumulee de la bouche et immedi-
atement apres il la remplit d'eau pour l'avaler; mais il fut
aussitot force de la rejeter, et declara qu'il n'avoit pu en
passer une seule goutte.

Il n'y avoit point de doute a avoir sur la nature de cette
maladie. M. Dickson conseilla de mettre le malade a jeun
homme dans un bain chaud. D'abord il y fut ~~tranquille~~ ^{calme} et
ferme agité, s'levant, se baissant et ayant quelquefois une
jambe hors de l'eau. enfui il resta assis pendant un peu de tems
de maniere que l'eau pût toucher son menton. il y resta ensuite
un peu de tems de l'autre coté de la gorge; les spasmes
cesserent même. il avala d'une cuiller de l'huile de balne
qui contenait ^{20 gouttes} ~~un peu~~ de teinture thebaïque; et il se trouva
mieux. il resta dans le bain environ 25 minutes. Etant couche
il eut une sueur tres abondante qui dura plus d'une demie heure,
pendant le tems il fut ^{très} parfaitement tranquille, ^{par} ensuite les douleurs
et le spasme de la joue et de la gorge se renouvelerent avec une
grande agitation. il avala une pillule de deux grains d'extrait the-
baïque apres il mangea presque une pomme entiere, du pain
et du beef longes par petites morceux. une demie heure il eut un
emission considerable. il prit ensuite une pillule de deux grains
d'opium. le vomissement augmenta de meme que les autres accidens.
on lui donna un lavement avec du baillon et un gros d'opium
de teinture thebaïque, qui se redonna avec le soir. le malade
mourut pendant la nuit, 8 jours apres l'apparition des symptomes
de l'hydropisie. il n'a jamais marque d'avoir de mortel aucun
personne. peu de jours apres sa mort il parut les parties de la
genetivité devinrent noires de meme que la gorge et l'apophyse
morue a la quelle il n'y avoit point eu d'ulceration

4 heures apres la premiere

2^e off. par D. Dietrich

Le domestique d'un jardinier fut mordu par le même chien au bras. il prit un spécifique que l'on dit être infallible contre la morsure de chiens enragés. les plaies du bras, les quelles avoient été considérables furent guéries; et l'homme put d'une bonne santé jusqu'au 28 avril suivant qu'il ~~en venant~~ ^{avait été} par plusieurs pots de bière et groisses tout à coup ~~il~~ ^{qu'il fut} impossible d'avaler. il avait rempli sa bouche de bière mais il ne put pour un presser une seule goutte dans l'œsophage; il la rejette avec une grande force et s'écria qu'il étoit un homme mort. il mourut en effet le 30 jour de l'apparition des symptômes.

3^e off. par le même

un homme âgé de 69 ans mordu le même jour et le même soir par le même chien resta dans l'hôpital pendant trois semaines et se sortit ensuite sans avoir aucune incommodité. cinq jours après il ressentit une douleur à l'épaule qui avoit été mordue, laquelle s'étendit jusqu'à la gorge. la respiration devint très courte, eut de la difficulté à boire, tomba dans le délire et mourut le cinquième jour. il cracha beaucoup de matière cummeuse pendant ce temps, vint point de sommeil et devint aveugle les quatre derniers jours. pendant les huit qu'il avoit été mordue il évacua une grande quantité de sang des parties blessées. Note des symptômes pag. 68.

observation par M. Fothergill & Watson

Ann 5^e p. 195.

Une domestique entrant un matin dans le lieu d'une maîson qu'on appelle le lavoir, fut assaillie par une chatte qui la mordit à la jambe. les cris firent accourir son maître & son fils; et il fut aussi mordu aux jambes mais très légèrement. on tua dans la même matinée cette chatte.

La plaie de la jambe de la domestique suppure & dégénéra en ulcère, le quel n'a été cicatrisé qu'au bout de six mois & demi. les morsures légères de la main furent très promptement guéries. les deux blessés prirent un médicament vanté pour préserver de la rage. la domestique n'a point eu d'accidens: le son du maître a été différent.



Deux mois après la morsure, il ressentit une douleur au ge-
droit qu'il attribua à un rhumatisme, par lequel il avoit eu
la même douleur en différents lieux les années précédentes. au
d'un mois et demi son incommodité augmentant, il prit de
petites pilules composées chacune d'un grain de calomel, de camphre
de pelacucum et de savon de chaque partie deux grains. après
en avoir fait usage pendant six jours il ressentit un chatou-
illement extraordinaire dans l'urètre, avec un effarlement
spasmodique et douloureux au scrotum et au pénis. il avoit son
urine d'urine et après avoir uriné il y avoit un flux d'humour
luciforme. il cessa l'usage des pilules qu'il avoit et les
causes de ces accidens. quelques jours après, il passa la nuit sans
dormir et éprouva de la difficulté à avaler. M. Fothergill
fut alors mandé en consultation. le Malade lui rendit un
compte exact de ce qui lui étoit arrivé depuis le moment qu'il
avait senti de la douleur au genou; il lui fit part de son
insomnie et de la peine pour avaler les liquides. en effet lorsqu'il
vouloit boire, il portoit d'une manière embarrassée et avec une
compresse le liquide à quelque distance de ses lèvres ensuite il le
mettoit promptement dans sa bouche, et l'avalait avec une
précipitation extraordinaire et avec grande agitation.
le Malade avoit naturellement l'ail vif et ardent; mais son
visage changeoit souvent d'une manière remarquable. son pouls
donnoit 90 pulsations et venoit presque à chaque minute par
rapport à la dureté et à la fréquence, il rendoit peu d'urine,
et se plaignoit beaucoup de la contraction du scrotum. il ne fit
aucune mention de la morsure, et ne cita tous ceux qui pourroient
donner lieu à l'en faire soupçonner.

M. Fothergill prescrivit une saignée au bras, et toutes les quatre
heures un bol composé d'un scrupule de cinnaabre et de deux
grains de musc. et engagea le Malade à prendre de la nourriture
à manger du pain trempé dans du vin, des fruits &c.
le soir la difficulté d'avalier fut plus grande: tous les muscles
qui servent à la deglutition parussent en convulsion, et le malade
qui le liquide touchoit la cavité de la bouche. il se plaignoit d'une
grande chaleur dans le gorge, et faisoit de grands efforts pour
reprendre et rejeter l'humour visqueux et fétide qui enduroit
le gorge. il avoit très peu uriné depuis le matin: la contraction
du scrotum et l'écoulement de l'humour luciforme, de même que
le pénis



le point de l'histoire suscitée encore. le sang tiré de bras
avait une marque légère d'inflammation. le malade avait
deux fois deux pillules.

M. Stettinville consulta le même soir avec le docteur Hatfield. ils
jugèrent à propos, qu'il se mit dans un bain au degré de chaleur
qui lui sembla le plus agréable, et qu'il se baignât de la main, il se frotta
lui-même les jambes et les cuisses avec deux gros d'onguent mercuriel
double. ils lui conseillèrent de se laver avec du lait et le lait dans
un drap quel on mettrait une fois de la poudre de sucre?
le bain chaud le soulagea pendant le temps qu'il y resta. mais ensuite
les souffrances se renouvelèrent avec plus de force. il devint plus agité
et eut un flux abondant de salive. le qui parut de mieux en mieux
ainsi dans la nuit avec un peu de difficulté et sans effort ni le
point ni l'effluve de l'humour sanguiforme. L'affection spasmodique
du pectoral fut aussi dissipée.

on conseilla de retirer la saignée, mais le malade etant de bon
après qu'il se trouva plutôt faible et qu'il ne perdit point une grande
quantité de sang. on conseilla même de le remettre dans le bain
chaud, et de le laisser autant de temps qu'il pourroit le supporter, et
de lui frotter les jambes et les cuisses avec une demi once d'onguent
mercuriel et enfin de lui faire prendre au fort du bain trois
pillules composées chacune d'un grain d'opium, et ensuite toutes les deux
heures jusqu'à ce qu'il parut de repos au sommeil
le soir de ce jour aux consultations dans les tenues les plus fortes le bien
qu'il avait retiré du bain chaud et dit qu'il endormit les espérances
d'un point d'établissement. la brèche étoit continuellement remplie
de salive visqueuse; il paroissoit aussi que les organes de la digestion
en étoient très humectés, ce qui lui produisoit une grande incommode
pour se débarrasser de la flux d'humour dans le temps qu'il se frottoit
dans la même brèche, il faisoit une expiration subite et violente, comme
s'il avoit essayé de rejeter en soufflant avec la force et la vitesse la
plus grande, un corps nuisible. ce qui produisoit un bruit semblable
au cri d'un chien qui aboye. quand il n'étoit point occupé de ces
efforts, il parloit enflamment et d'une manière saine.
avant de prendre le bain, il ~~devoit~~ avoit désiré d'être rassuré. et de les rassurer
mais on remarqua que dans le touchant quelques ^{manifestes} ~~manifestes~~ ^{sur son visage} ~~sur son visage~~
avec le bain de saignée, il se reculoit avec une sorte de surprise. et toute
la fois qu'une partie étoit subit touchée par le bain, il éprouvoit une
commotion considérable, tandis qu'il ne paroissoit point affecté lorsqu'on
remouilloit celles qui l'avoient déjà été. L'application du résidu produisoit



grosfals pendant un tems considerable avant l'accident; et il y avoit
eu des ulcres a la jambe qui n'avoient jamais été mondés. quelques
heures après la blessure, on y appliqua le cautere actuel. et les frictions
ensuite la partie avec l'onguent mercuriel. le soir le docteur dans la
premier jour; on continua le panserment avec l'onguent mercuriel
jusqu'à ce que la plaie fut cicatrisée.

Le second jour il prit un bol de 4 grains de turbith mineral et de huit
grains de camphre; il vomit beaucoup et fut plusieurs fois à la selle. les
salivations continuèrent à se stabilir. le 3^e jour on fricta la jambe mondée
avec l'onguent mercuriel et dans la nuit d'un onguent on repéta cinq fois les
frictions, aux deux jambes: chaque friction fut de 10 grains. le malade

pendant cet espace de tems

prit aussi cinq fois le bol de quinquina et de sucre. le traitement eut une large
salivation jusqu'au 4^e jour. on lui donna entre le 4^e et le 5^e jour huit onces dans la
nuit, le 5^e jour un bol fait avec le powder de colic composé de 4 grains de Musc
et de deux grains de camphre qui excita chaque fois un vomissement assez
violent. depuis pendant les sept ou 8 premiers jours il prit quatre fois un grain
de powder d'anagallis flore purissimè nouvellement mûle. le 4^e jour
il avala le bol de turbith pour la 7^e fois: et le jour suivant il fut pansé
le bain de mer qu'il continua deux jours au plus. il eut grand besoin
de dormir un peu.

Le 7^e jour il fut pris une malade dans la gorge et bientôt après une difficulté
à avaler de la nourriture. le soir il ne put point en avaler. il se plaignoit de ces resses
comme dans la gorge les os de la gorge et de la difficulté de respirer. le jour suivant
il faisoit très chaud, il fut à merveille et y arriva le soir. pendant cette
jour née il ne put rien avaler et on trouvant un petit ulcère il fut
laissé d'horreurs. M. Raymond le vit le même soir. son visage étoit défiguré
les yeux agrandis et farouches. il pouvoit sans cesse et avec une grande rapidité;
il se plaignoit d'une douleur brûlante, fut très agité, cherchoit à se plaindre
avec une vitesse extraordinaire. on lui offrit à boire, il prit le verre, mais en
le portant à la bouche, il pouvoit troubler, fit une profonde inspiration et
le verre tomba le verre. il avala seulement une pillule d'opium. ensuite
on le saigna deux fois du bras et deux fois du pied; le soir on appliqua
il vint avec des efforts violents une matière glaireuse ensuie il mourut le
second jour de l'apparition des symptômes de la rage, comme s'il avoit été
frappé au triangle.

M. Raymond pensa qu'on n'a point appliqué le cautere
à cet autre exemple de l'insensibilité de frictions mercurielles. M.
Raymond rapporte qu'un chirurgien de Marseille traita il y a environ 15 ans
un petit fils âgé de 12 ans qui avoit été mordu par un chien enragé.
il lui fit faire des frictions mercurielles comme dans le cas de la rage. néanmoins
elle n'eurent de l'hydrophobie le 3^e jour. la plaie n'avoit point été cautérée.

M. raymond cite un exemple d'hydrophobie spontanée qui res-
semble à la rage au mieux dans le premier degré de mal. un ~~jeune~~
garçon âgé de 12 ans, d'un tempérament bilieux et délicat, fils d'un
maître pieux fut attaqué de pleuroisie dans le mois d'août 1764.
il n'avait point été blessé par aucun animal. il fit des efforts pour va-
cuer hors de son lit et ne put point en briser il était extrêmement a-
douré. son lit. son visage devint pale et il perdait avec sueurs. il mourut le
2^e jour de son attaque.

J'ai eu occasion de voir à l'hôpital de la charité de paris un hom-
me qui vers le 20^e jour d'une fièvre maligne eut les symptômes de l'hydro-
phobie plaignant d'un grand resserrement de la gorge, et ne voulant point
avaler aucun liquide. il eut des vomissements convulsifs de la bile et de
la différents parties du corps; avec une matière verte et écumée et une
forte fièvre. mais il en ~~convalescent~~ ^{se rétablit} car l'hydrophobie est une ma-
ladie convulsive quelquefois spontanée dans l'homme comme dans le chien
dans l'autre animal.

il consulte des observations de M. raymond que ni la poudre de corail, ni
turbithe minéral ni lamagallie, ^{ni le lait de chèvre} sont des spécifiques dans l'hydrophobie

tom. 1^{er} pag. 290.

M. fothergill dans ses remarques sur le traitement des personnes mor-
pues ou animales ^{par le lait de chèvre} pense que le lait de chèvre n'est point éti-
opé comme un préservatif des effets pernicieux d'un venin de la
le morsure d'un chien introduit dans la gorge par exemple et la
toute la fait continuer par un usage de marion que les écrits qui
que le lait est le plus certain de tous les préservatifs. il pense que cette
a été adoptée d'après la faiblesse que donne celle sur le traitement qui
consiste de faire avec ^{de la poudre de corail} ~~de la poudre de corail~~ ^{un onguent} ~~un onguent~~ ^{un onguent} ~~un onguent~~
n'est point suffisamment ^{à la dose de 10 grains} ~~à la dose de 10 grains~~ ^{à la dose de 10 grains} ~~à la dose de 10 grains~~
et que la crainte de la mort de l'hydrophobie se manifeste. ^{à la dose de 10 grains} ~~à la dose de 10 grains~~ ^{à la dose de 10 grains} ~~à la dose de 10 grains~~

liv. 5^e cap. 27.

dit il est de jeter tout à coup les personnes malades lorsqu'il n'y a
point dans une piscine qu'il n'y aura point au auparavant. si le
point usage, il faut le laisser plonger par quel bois et tantôt la de-
mais si le point usage de l'infirmité quelques fois pour qu'il soit force
malade lui de briser. par le point on parvient à guérir et de la de-
de la crainte de la mort. est pour l'usage de la même manière, dit
fothergill que j'ai appris que les traités de maladies morales et que
quelque apparence de symptômes de rage, dans les places de bains qu
les plus en réputation. mais il n'y a pas la même raison pour les
qu'une semblable procédure puisse contribuer à guérir la maladie d
le mal finisse. d'ailleurs l'expérience ne nous offre point de la
il est donc très à propos de ^{de temps} ~~de temps~~ ^{de temps} ~~de temps~~ ^{de temps} ~~de temps~~
possible est comme ^{de temps} ~~de temps ^{de temps} ~~de temps~~ ^{de temps} ~~de temps~~
recommandée par les auteurs et que la raison et l'expérience nous
beaucoup plus avantageuse.~~

le mouvement très aisément d'un côté de l'articulation de l'autre;
 il sentoit une grande douleur en marchant; quand il appuyoit
 sur le condyle externe du fémur.
 il y avoit un gonflement dans parties extérieures du genou qui se
 dissipait par le repos, le régime &c. ensuite M. Ford ayant le consen-
 tement du malade, se procéda à l'extraction de la manière suivante dont
 M. Broussais le propose. la jambe étant étendue, le corps étranger
 retenu fixe par ~~la main~~ ^{un aide} au côté interne du genou, M. Ford
 fit une incision de la longueur de deux pouces à travers les tegumens,
 et ensuite une plus petite sur le corps lui-même et jeter par l'issue de
 la synovie qu'il avoit comprimée le ligament capsulaire; le corps qui
 étoit cartilagineux sortit aussitôt par cette ouverture; il n'y eut point
 une grande ^{difficulté} pour ^{faire} cette opération. ensuite il réunir
 aussitôt les bords de la plaie et les maintint dans un contact convenable
 par le moyen d'emplâtres agglutinatifs et d'un bandage unissant.
 on traita le malade par les antiphlogistiques; on lui tira d'abord
 six ou sept onces de sang et on répéta deux fois cette saignée dans l'espace
 d'une semaine; mais elles furent moins fortes; on le mit à une
 diète assez sèche, on lui tint constamment le ventre libre et on fit
 avec le bandage avec l'eau de gomme universelle. il n'y eut
 aucun symptôme d'angine jusqu'au 7^e jour que le malade se
 plaignit d'une douleur au genou, de mal de tête, ~~et de la fièvre~~
 altérée, et de la soif, des nausées, fut très agité et il eut pour
 le sang. M. Ford examina le genou et trouva la plaie presque
 agglutinée. il le saigna et lui fit prendre une potion purgative.
 le lendemain matin une rougeur ^{forte} ~~apparut~~ ^{se manifesta} parut sur
 toute l'étendue du corps. cette nouvelle maladie ne fit rien changer
 pour le plan de cure, le même régime fut continué; la rougeur
 disparut au terme ordinaire; le genou ne fut plus douloureux, et
 dans peu de jours la plaie fut entièrement guérie.
 on lui permit ensuite de se lever, mais en lui recommandant
 de se servir de son genou avec grande précaution, et quand il
 marchait, de le tenir étendu, ^{le malade eut de la peine à}
 observer, mais le ^{quel} ne pouvoit aucun ^{grand} obstacle dans la liberté
 des mouvements. Au mois après l'opération, il retourna ^{à son} ~~passer~~ ^{à son} dans
 un parfait état de santé.



Le corps toujours très intimement cartilagineux, envoie à une de ses surfaces et un peu en dedans l'autre. il y avoit en partie autour de son bord des fibres très deltes qui ressembloient beaucoup à des poils.

M. Boie dit qu'il ne sait d'après quelle autorité Regnumus a
 rapporté que cette maladie étoit fréquente en Angleterre. En commu-
 niquant le fait à M. Hunter, il lui a remarqué qu'en dissequant
 l'articulation de genou, il avoit souvent trouvé des portions de
 cartilage entièrement libres dans la cavité ou qui lui étoient un peu
 adhérentes par des petites fibres, et dernièrement ajout-il, j'ai vu
 dans l'intérieur du genou d'un enfant qui m'est immédiatement
 après sa naissance, j'ai vu une portion de cartilage qui dépendoit
 étoit formée à l'extérieur des condyles du fémur, la quelle auroit
 probablement donné lieu à une maladie semblable si l'enfant
 avoit vécu et si quelque accident eût détaché son détachement
 de la rupture de son adhérence. Il m'a semblé que dans
 l'observation précédente le corps cartilagineux étoit primitivement
 attaché par de petits ligaments à l'intérieur des parties de l'arti-
 culation, mais qu'à la longue augmentant de volume, il a été
 séparé de son attache dans l'instant de la chute qu'a faite le
 malade.

malade
il est difficile de déterminer comment se forment les corps étrangers.
sont de des portions de cartilage qui revêtent les condyles du fémur, la
face interne de la rotule. Morgagni a vu dans le genou de la femme
dont il a été fait mention cy dessus, que le cartilage de la rotule dans
la portion qui regardait le condyle externe du fémur, étoit comme usé
et rempli de petits filons parallèles & que celui du même condyle
du fémur étoit si aminci qu'il étoit ~~à peine~~ ^{à peine} visible par rapport à l'os
qui étoit apparent à travers la substance de cette ^{membr.} ~~ligament~~ ^{membr.} cartilagineuse. Dans un autre cas il a vu ~~cette~~ ^{une} ~~cartilage~~ ^{membr.} le cartilage
de condyle externe du fémur comme corrodé dans l'étendue que
peut présenter l'ongle du petit doigt; & il n'y avoit aucun vice à la
rotule, ni dans toute l'autre partie de l'articulation; et il
n'a remarqué aucun corps globuleux. ~~Morgagni~~ ^{Morgagni} ne pense que les
corps soient des morceaux de cartilage séparés de ceux qui revêtent les
surtout plus qu'il y a des exemples de ces sortes de corps étrangers,
sans que aucune cause extérieure ~~ait~~ ^{soit} ~~ait~~ ^{ait} agi ~~sur~~ ^{sur} sur
l'articulation, il ~~est~~ ^{est} parait plus vraisemblable qu'ils naissent de

adherents.
Quelque soit la naissance et la formation de ces corps; les points les plus intéressants ont rapport au diagnostic et au traitement de la maladie.
ils paraissent ~~suffisamment~~ dignes d'être établis d'après les observations
rapportées. L'existence du corps étranger insinué aux fonctions du membre
indique nécessairement son absence ou plutôt son extraction. il ne saurait
point qu'un bandage propre à fixer le corps dans un endroit de l'article
pour qu'il y entre sans adhérence vive avec le sucs, et l'on ne peut
rien déduire de cet égard de l'observation de M. Gouche, puisqu'il n'a
point vu le malade et qu'il n'est même point affirmé qu'il ait porté
des bandages enroulés. L'extraction est la seule ^{moyen de guérison} ~~manière de traitement~~ que le plus
certain et en même temps celui qui doit être préféré; ^{mais} de tous les moyens

[illegible]

" La Société a été informée de plusieurs cas de cette nature ou l'opération rapportée ci dessus a été mise en pratique. Dans quelques cas comme dans celui dont il vient d'être fait mention, on a obtenu la guérison sans aucun inconvénient; dans d'autres il se survient des gonflements avec une inflammation violente, avec fièvre, et la mort s'en suit. Une observation très exacte de faits semblables nous porte à penser que le succès ^{dans quelques uns} est dû attribué au ~~pas le traitement de la plaie~~ par les premières intentions et que les accidents et la mort dans d'autres cas ont eu lieu à cause de la suppuration de la plaie et qu'on a pu remarquer la matière purulente s'est répandue dans les parties adjacentes et s'est diffusée dans les parties adjacentes. Mais outre cela la

~~même~~ ^{possible} traitement qui consiste à ^{maint} tenir les lèvres de la plaie
dans un contact parfait, il faut que le membre reste en repos, et
comme dans ~~le fait de M. foy~~ le fait de M. foy, éviter toute chose qui puisse
irriter les parties ou chauffer le corps.



J. Chopart.

M. fothergill expose d'abord le passage de l'écume, qui marque que le chien qui a modus est enragé, il faut donner issue au virus en appliquant une ventouse ensuite on brûle la plaie, si le lieu où elle siège n'est point un nerf ni un vaisseau.

Cette est le premier objet de traitement que doit occuper ceux qui prennent soin de doubles malades; il faut brûler la plaie, si la situation de la partie le permet, et exciter une suppuration ^{abondante} longue et continue, autant qu'il est possible. M. fothergill cite un exemple du docteur folk sur les bons effets d'écarter et d'emporter avec l'instrument tranchant la partie blessée et rapporte ensuite d'après un ouvrage de M. thomas perrault, que quand quelques-uns abordent par un animal enragé comme il arrive souvent dans les pays montagneux de l'écluse, il coupe sur le chignon avec un rasoir et emporte toute la chair de la partie blessée, il laisse saigner abondamment la plaie et la couvre avec plusieurs toiles d'araignée. ceux qui vont point de l'écluse de ceiser la partie blessée, ils étendent la plaie à saigner et la ferment avec de l'huile chaude ou du beurre fondu.

Dans le parti meridional de l'europe on les animaux venimeux sont plus fréquents, c'est une pratique usitée par les peuples de la chère qui sont infectés, par les animaux, de remplir ou de couvrir la plaie avec de la poudre de cannes à dy mettre le feu. si la blessure n'est pas considérable, ils y font une incision, y mettent de la poudre et ensuite le feu. par ce moyen ils aggrandissent en un seul tour la plaie et empêchent la guérison prompte. M. fothergill pense que dans les sujets timides on pourroit employer avec avantage le procédé, ne appliquer une emplâtre desiccative. si c'est un remède préservatif des accidents de la rage, c'est sans doute le plus sûr.

les deux observations suivantes tendent à le prouver. M. raymond a soigné une femme âgée de 48 ans qui a été mordue le 24 sur une jambe par le même chien. l'animal la mordit ^{abondamment} et même frotta que M. raymond et par le même chien. la plaie avait environ 4 pouces de long et deux à trois lignes de profondeur. quelques heures après l'accident on appliqua sur la plaie un fer rouge. on traita cette malade comme M. raymond excepté qu'elle ne prit qu'une fois de l'écume par la quelle elle fut guérie dans trois mois. on lui frotta d'onguent mercuriel les jointures de la cuisse quelques fois dans l'espace d'un mois. cette femme accoucha à terme d'un enfant vivant et se continua à jouir d'un bon état. c'est la suppuration de la plaie que l'on peut attribuer plus particulièrement la guérison, car par ce que l'animal ^{enragé} mordant le malade a virus communiqué de virus. ~~par ce que l'animal enragé mordant le malade~~ L'autre observation est de M. fothergill. Voyez pag. 24 vers la fin



M. Jothergill pense que la guérison de la fille a pu dépendre de la suppuration qui a formé l'ulcère de la jambe, tandis que les plaies du maître ont été trop promptement guéries. C'est peut-être une preuve bien forte de l'utilité d'agrandir les plaies faites par la morsure. L'usage et d'entretenir la suppuration pendant un assez long tems, il conseille de laver d'abord la partie, de nettoyer la plaie autour qu'il est possible et de l'agrandir sur le champ, et par l'instrument ou par le fer et de la laisser suppurer longtemps.

Deux circonstances particulières lui paraissent dignes d'attention; en savoir si la partie mordue étoit couverte d'un tégument épais, de peau ou d'une autre matière, par le que dans le cas il y auroit pu être uning de danger à craindre que si la peau étoit à nud. Le second est de ne point tuer l'animal jusqu'à ce qu'on n'ait aucun doute qu'il soit usagé. La connaissance de ces deux cas peut contribuer à la tranquillité de la personne mordue, et il est même à propos de lui dire qu'il est très petit nombre de ceux qui font mordus par des animaux usagés sans éprouver aucun fâcheux effet mortel de la rage. Je rapporte ajouti cette circonstance non point dans la vue que diminuer les soins qui conviennent en pareils cas tels qu'ils sont particuliers d'agrandissement de la plaie, mais comme une espèce d'antidote contre le découragement ou le desespoir dans le quel tombent les malades par la connaissance de leur accident.

Comme il y a encore peu d'exemples d'usages de cadavres de personnes mortes de la rage, je terminerai cet extrait par le rapport de ce que j'ai remarqué dans un cas de cette espèce. J'exposerai les principaux objets de l'observation.

Un bijoutier âgé de 42 ans, nommé Moysè Dablon, demeurant rue St. Louis près le palais, d'un tempérament bilieux et mélancolique, aimant la solitude, et sujet depuis quelques années, dans le mois de mars, à des trassaillements, a été mordu le 13 janvier 1768 par une chato qui avoit, dit-on, été mordue elle-même par un chien usagé. Cette morsure faite à la partie externe de la jambe-phalangie du pied de la main droite, a été guérie en très peu de jours, et n'a donné aucune inquiétude à cet homme. Le sept mars, il sentit une douleur vive dans le poignet droit, la quelle se fit ensuite sentir le long du bras jusqu'à la gorge. Il eut les symptômes de l'hydrophobie, aversion pour l'eau, oppression de poitrine, nombreux convulsions dans le muscle du bras et de la face. M. Roussard et d'autres Médecins furent invités, et lui donnèrent des saignées. on lui donna le castoréum, des pillules de musc et d'opium; on le frotta avec l'onguent mercuriel. Les accidents augmentèrent, il eut quatre accès violents de convulsions et mourut le lendemain au soir.

pendant sa maladie il n'a mordu personne & n'a point eu envie de mordre. il demandoit souvent à voir la lumière de saut quelle lui feroit plaisir & le rejoignoit. non seulement il avoit de l'aversité pour l'eau; mais il se fâchoit & criait, quand on l'apportoit à boire. il est remarquable que le domestique de la bijouterie a été mordu par la même chate, sans éprouver les mêmes accidents.

Voici ce que j'ai observé dans l'examen anatomique des parties. La machine inf. étoit fortement appliquée entre le sup. l'antérieur de la bouche étoit sec, la langue étoit sèche & retirée ^{derrière} l'arrière-bouche. la luette un peu plus longue étoit infiltrée. j'en apperçus aucune arête, aucune inflammation au larynx & aux plèvres. tout excepté le grand pube, étoit dans un état ordinaire. les trachées artères contenoient un peu de matière écumée; la membrane intérieure étoit un peu boursouflée. les bronches saines paroissant fort grosses; on les remplissoit d'un sort point de sang. les cellules étoient des diffindus. il y avoit des la surface des pommons des petites vésicules remplies d'air. je ne trouvai rien de particulier dans le cœur. l'estomac & l'intestin duodénal étoient remplis de matière glaireuse verdâtre. le foye regorgoit de sang; point de bile dans la vésicule du foye. Dans la tête une humeur glaireuse, blanchâtre & d'une consistance gélatineuse remplissoit les cavités de la pie-mère, & l'enveloppoit en cette membrane recouverte les parties internes & sup. de l'hémisphère droit de la cervelle. la surface de la corne étoit d'une couleur brune dans le même endroit. en général toute la substance paroissant molle & fort humide. les ventricules contenoient beaucoup de secret. le foye & la vésicule avoient plusieurs points d'effusion. L'ouverture du cadavre a été faite dix heures après la mort. L'attention de cette observation par rapport à la nature du cadavre est sensible par laquelle expose le cadavre lequel étoit tout le corps. la difficulté de la digestion n'est donc point un effet de l'inflammation; elle peut survenir à la suite de l'infarction & la suite de la convulsion fréquente de l'organe de la digestion & de ceux qui servent au passage de l'air. mais est un accident consécutif. tous les symptômes indiquent que la disposition vicieuse étoit dans le gros cerveau & que l'hyperphorie est une maladie convulsive qui dépend d'une altération particulière & invisible du cerveau. Presque deux personnes mordus par le même animal, & il arrive que l'un est mort, & que l'autre n'a point eu d'accident. le second point le seul exemple qui ne parait être. mais avant de résoudre cette question, il faudroit avoir un plus grand nombre de faits pour en examiner les différents rapports. souvent des raisonnements très plausibles sont détruits par les preuves d'un fait qui n'a point prévu.

Chapard.

